

Zagrożenia z udziałem dzikich zwierząt

2017-11-17 02:21 Poradniki

Zagrożenia z udziałem dzikich zwierząt

Główne zagrożenia dla ludzi ze strony niebezpiecznych zwierząt to: pogryzienia, ukąszenia, zainfekowanie wścieklizną, które w swych skutkach może doprowadzić do śmierci lub trwałego uszkodzenia ciała..Jedynym jadowitym wężem żyjącym na wolności na terenie całej Polski jest żmija zygzakowata. Inne jadowite węże mogą występować w naszym kraju tylko, jako zwierzęta domowe.

Objawy ukąszenia:

- Dwie punktowe rany(miejsce ukąszenia);
- Narastający obrzęk, zaczerwienienie, bolesność w miejscu ukąszenia;
- Zawroty głowy;
- Pocenie się;
- Uczucie narastającego lęku;
- Bładość;
- Przyspieszenie tętna i oddechu;
- Nudności, wymioty;
- Ogólne osłabienie;
- Drgawki.

Pierwsza pomoc przy ukąszeniach przez węża:

- Oceń sytuację i bezpieczeństwo(zapytaj poszkodowanego o wygląd węża i czas

ukąszenia);

- Wezwij pogotowie ratunkowe lub inną pomoc;
- Uspokój poszkodowanego, szczególnie dzieci (podczas całej akcji ratunkowej poszkodowany powinien leżeć nieruchomo z kończynami poniżej poziomu serca- w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się jadu w organizmie)
- Wykonaj ponad miejscem ukąszenia kilka obwojów kolistych szerokim bandażem lub zastosuj chustę trójkątną- zaciskaj nie za mocno i co 10-20 minuty zwalniając ucisk na 1-2 minut;
- Bezpiecznie jest ochładzać miejsce ukąszenia;
- Sprawdzać okresowo czynności życiowe poszkodowanego;
- Okryj ciepło poszkodowanego i zapewnij mu wsparcie psychiczne;
- Podawaj duże ilości płynów.

Pamiętaj!!!!

- Nie wolno wysysać krwi ustami;
- Nie wolno nacinać i masować miejsce ukąszenia;
- Nie wolno podawać alkoholu, leków cucących;
- Nie wolno podawać surowicy przeciw jadowi żmij bez decyzji lekarza.

Pierwsza pomoc przy użądleniach:

- Uspokój poszkodowanego;
- Wezwij pomoc;
- Usuń żądło w taki sposób aby nie uszkodzić zbiorniczka z trucizną;
- Stosowanie zimnych okładów w celu złagodzenia bólu i ograniczenia obrzęku;
- Podanie kostki lodu do ssania zmniejszy obrzęk w przypadku ukąszenia w obrębie jamy ustnej i szyi;

- Zapewnienie poszkodowanemu dalszej pomocy.

Objawy użądlenia:

- Bolesność, pieczenie lub swędzenie, zaczerwienienie i obrzęk miejsca użądlenia;
- U osób uczulonych mogą wystąpić następujące objawy ogólne:
 - dreszcze; – podwyższona temperatura ciała; – bóle i zawroty głowy; – przyspieszenie tętna; – duszność i zaburzenia oddychania.

Ukąszenie przez kleszcza:

• Usuwanie kleszcza powinno być wykonane natychmiast po wykryciu go przez personel medyczny, jeśli natychmiastowa pomoc medyczna jest nie możliwa, kleszcza należy chwycić pęsetą za odwłok bardzo blisko skóry i wyciągnąć zdecydowanym ruchem ku górze oraz w bok. Nie wolno go wyciskać i wykręcać oraz smarować tłuszczem lub spiritusem;

- Po usunięciu kleszcza należy skontaktować się z lekarzem;
- Gdy podczas usuwania kleszcza jego główka pozostanie w skórze;
- Jeśli w miejscu ukłucia powstanie okrągłe powiększające się zaczerwienienie;
- Jeśli do ukłucia doszło na terenie, gdzie kleszcze przenoszą wirusy zapalenia opon mózgowych lub bakterie wywołujące boreliozę. Informacje na ten temat udziela prasa lokalna, stacje sanepidu oraz lekarze;
- Jeśli po ukłuciu pojawi się jeden z następujących objawów:
 - wysoka gorączka, mdłości, sztywność karku, zaburzenia świadomości; – paraliż, niedowłady; – powiększone węzły chłonne; – bóle stawów.

Pierwsza pomoc przy pogryzieniach:

- Uspokojenie poszkodowanego;
- Zebranie informacji o okolicznościach, gatunku i czasie pogryzienia;
- Wezwanie pomocy;

- Nałożenie powyżej ukąszenia szerokiego bandaża i pozwolenie na wypływ krwi z rany przez 5-10 minut;

- Przemywać ranę wodą z mydłem lub wodą utlenioną;

- Założenie na ranę jałowego opatrunku;

- Uniesienie i unieruchomienie kończyny;

- Ciepłe okrycie poszkodowanego i zapewnienie mu wsparcia psychicznego;

- Powiadomienie służb sanitarno- epidemiologicznych o pogryzieniu przez bezpańskie lub dzikie zwierzęta.